



توسيف كير

التركيب:

كل كبسولة تحتوي على أوكسوميمازين (هيدروكلور ايد) ١,٦٥ ملغ، باراسيتامول ٣٣,٣ ملغ، غوافينيزين ٣,٣ ملغ، صوديوم بنزوات ٣٣,٣ ملغ.

السواغات:

لاكتوز لامائي، تالك، نشاء الذرة، ثنائي أوكسيد السيليكون الغرواني، شمعات المغنيزيوم.

الخصائص الدوائية:

هذا الدواء هو مشاركة لأربع مواد: أوكسوميمازين، مضاد للهيستامين صناعي مع خصائص مضادة للسعال ومهدنة. غوافينيزين، مطهر للشعب الهوائية، مبيد لإفرازات القصبات ومقشع، باراسيتامول، خواص مسكنة وخافضة للحرارة، وصوديوم بنزوات، الذي يسبب إنتاج أمونيا أقل من الجسم. لذلك يستخدم لعلاج السعال من منشأ التهابي، تحسسي أو حتى إنتاني، ويمكن أن يترافق مع المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب بالاعتماد على منشأ السعال.

الاستقطابيات:

العلاج العرضي للسعال (مهيج، غير منتجة، تشنجي، جاف) المرتبط بالظروف التنفسية المختلفة.

مضادات الاستقطاب:

- الأطفال دون السنتين من العمر

- يجب عدم إعطائه مع منتج آخر يحتوي على الباراسيتامول.

- يجب عدم إعطائه للمرضى الذين لديهم حساسية تجاه أي من المكونات.

- مرتبطة بأوكسوميمازين هيدروكلور ايد: قصور في الجهاز التنفسي أيا كانت الدرجة.

- مرتبطة بالباراسيتامول: قصور كبدي خلوي.

- يتم إعلام الطبيب إذا كان لدى المريض مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل في الكبد أو داء السكري.

- الرضاعة الطبيعية.

- التفاعلات التحسسية.

التحذيرات والاحتياطات:

- قبل البدء بالعلاج المضاد للسعال، فمن المناسب التحقق من أسباب السعال لتحديد الأسباب التي تتطلب العلاج بذاتها من بين أمور أخرى بشكل أساسي الربو، السرطان، علة داخل القصبات.

- إذا استمر السعال بعد إعطاء مضاد للسعال في الجرعات المعتادة، فإنه لا ينصح بزيادة الجرعة، ولكن بإجراء إعادة نظر للحالة السريرية.

- يجب إعلام الطبيب عن المرض المتواجد مسبقاً، التحسس والظروف الصحية الحالية.

- يجب أخذ الحذر عند إعطاء هذا الدواء لسائقي المركبات أو الآلات التي يحتمل أن تكون خطرة بسبب خطر النعاس.

الحمل:

لم يتم إثبات سلامة هذا الدواء خلال فترة الحمل. لذلك، ينصح باستخدامه فقط بعد تقييم المخاطر إلى الفوائد.

الاستخدام عند المسنين:

لا توجد تحذيرات خاصة وتوصيات بشأن الاستخدام السليم لهذا الدواء عند المرضى المسنين.

التداخلات الدوائية:

- مرتبطة بأوكسوميمازين هيدروكلور ايد: يجب تجنب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.

- يتم إعلام الطبيب عن أي أدوية يتناولها المريض، قبل البدء، أو أثناء العلاج.

- قد يحفز هذا الدواء الجهاز العصبي المركزي والاكنتاب وكذلك الأتروبينات المركزية، عندما يعطى بالمشاركة مع المواد المضادة للفعل الكوليني الأخرى (مضادات الهيستامين الأخرى، إيميبرامين، الفينوثيازين، مضاد الباركنسون، مضادات الفعل الكوليني، مضادات التشنج الأتروبين وديسوبراميد).

- قد يتداخل هذا الدواء مع الأدوية التالية: لوميتابيد، ميبومرسين، كيتوكونازول، لفونوميدي، بريلو كابين، بروينيبيدي، تيريفلونوميدي.

- قد يتداخل هذا الدواء مع بعض الفحوص المخبرية.

التأثيرات السلبية:

- بشكل عام، يملك الجسم تحمل مرتفع تجاه هذا الدواء.

- حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة مع هذا الدواء.

- التأثير الملاحظ الأكثر شيوعاً هو النعاس. بشكل نادر أكثر، إمساك واحتباس البول، تخطيط عقلي، وجفاف الفم، والآثار المعدية المعوية (بشكل خاص عدم التحمل الهضمي)، خلل الحركة المتأخر، يمكن ملاحظة نقص الكريات البيض وندرة المحببات.

- إذا حدث أي رد فعل غير سارة أثناء العلاج، يتم إعلام الطبيب فوراً.

- استشر الطبيب في حال ملاحظة المريض أي من الآثار الجانبية التالية: آلام في البطن، حركات رخوة، إقياء، طفح حاك جلدي، طفح، شعور بالمرض، احمرار الجلد، ضيق النفس، تورم ملامح الوجه، الغثيان شذوذ في خلايا الدم، انخفاض خلايا الدم البيضاء، نخر أنيبي كروي حاد، خلل الدم، تغيرات في لون البشرة، برودة اليدين والقدمين، تخطيط، جفاف الفم، حمى أو رعاش، بشرة جافة، زيادة الجوع، زيادة العطش.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

البالغين: ١ - ٢ كبسولة مرتين إلى ٣ مرات في ٢٤ الساعة.

- يجب الالتزام بجدول، والجرعات ومدة العلاج.

- التوقف عن العلاج: يجب عدم التوقف عن العلاج دون إعلام الطبيب.

- في حال نسيان جرعة، يجب استخدامها فور الملاحظة. في حال كانت قريبة من وقت الجرعة التي تليها، يتم تخطي الجرعة المنسية ويتابع جدول الجرعات. يجب عدم مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة المنسية.

فرط الجرعة:

مرتبط بأوكسوميمازين هيدروكلور ايد: قد تتميز الصورة السريرية بالاكنتاب والغيوبية. العلاج عرضي والذي قد يكون ضرورياً للتفسي الاصطناعي ومضادات الاختلاج.

مرتبط بباراسيتامول: تسبب الجرعة المكثفة انحلال خلوي كبدي، مع قابلية حدوث تنخر كامل وغير عكوس. تظهر العلامات السريرية عادة خلال ال ٢٤ ساعة الأولى. يجب أن يتم العلاج في وحدة متخصصة.

شروط الحفظ:

يحفظ المستحضر في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ مئوية، بعيداً عن الضوء والرطوبة، بعيداً عن متناول الأطفال

التعبئة:

عبوة من الكرتون تحوي ثلاث صفايح pvc/alu كل صفيحة تحتوي ١٠ كبسولات.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

(مجلس وزراء الصحة العرب)

(مجلس وزراء الصحة العرب)

شركة أوغاريت للصناعات الدوائية
فنري وشرخاه، حلب - سورية



Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com



TUSSI CARE



Composition:

Each capsule contains: Oxomemazine (as hydrochloride): 1.65mg, Guaifenesin 33.3mg, Sodium Benzoate 33.3mg, Paracetamol 33.3mg.

Excipients:

Lactose anhydrous, Talc, Corn starch, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate.

Pharmacologic properties:

this drug is a combination of four substances: oxomemazine, synthetic antihistamine, with antitussive and sedative properties; guaifenesin, antiseptic of the airways, fluidifying bronchial secretions and expectorant, paracetamol, analgesic and antipyretic properties, and of sodium benzoate; causing less ammonia to be produced by the body, therefore it is used in the treatment of cough of inflammatory, allergic or even infectious origin and may be associated with antibiotics or anti-inflammatories, depending on the origin of the cough and.

Indication:

Symptomatic treatment of cough (irritative, non-productive, spasmodic, dry) associated with various respiratory conditions.

Contraindications:

- Children under 2 years of age.
- It should not be given with other product containing paracetamol.
- It should not be given to patients allergic to the any of the components.
- Linked to oxomemazine hydrochloride: respiratory insufficiency, whichever be the degree.
- Linked to paracetamol: hepatocellular insufficiency.
- Tell the doctor if the patients have respiratory problems, liver problems or diabetic.
- Breast feeding.
- Allergic reaction.

Precautions and warnings:

- Prior to the initiation of antitussive treatment, it is appropriate to investigate causes of cough to identify those that require etiological treatment itself, mainly asthma, cancer, endobronchial affections, among others.
- if cough persists after administration of antitussive in usual doses, it is not advisable to increase the dosage, but to make a review of the clinical status
- The doctor should be informed about the pre-existing diseases, allergies and current health conditions.
- Caution should be exercised when administering this drug to vehicle drivers or potentially dangerous machinery due to the risk of drowsiness.

Pregnancy:

The safety of this drug during pregnancy has not been established. Therefore, it is recommended that its use only be made after evaluation of the risk-benefit ratio.

Use in elderly:

There are no special warnings and recommendations on the proper use of this drug in elderly patients

Drug interactions:

- Linked to oxomemazine hydrochloride: alcoholic beverages should be avoided during treatment.
- Tell the doctor about any medicines that the patients are taking, before starting, or during treatment.
- This drug may potentiate CNS depressants as well as central atropines, when in combination with other anticholinergic substances (other antihistamines, imipramine, phenothiazine, antiparkinsonians, anticholinergics, atropine antispasmodics and disopyramide).
- This drug may interact with the following drugs: lomitapide, mipomersen, Ketoconazole, Leflunomide, Prilocaine, Probenecid, Teriflunomide.

- This drug may Interfere with certain laboratory tests.

Adverse Reactions:

- In general, the body has a high tolerance to this drug.
- The most commonly observed adverse effect is drowsiness. more rarely, constipation and urinary retention, mental confusion, dry mouth, gastrointestinal effects (in particular digestive intolerance), tardive dyskinesias, leucopenia and agranulocytosis may be observed.
- If any unpleasant reaction occurs during treatment, tell the doctor immediately.
- Consult the doctor if the patient observes any of the following side-effects: Stomach pain, Loose motions, Vomiting, Itchy skin rash, Rash, Feeling of sickness, Skin reddening, Shortness of breath, Swollen facial features, Nausea, Abnormalities of blood cells, Less white blood cells, Acute renal tubular necrosis, Blood dyscrasias, Changes in skin color, Cold hands and feet, Confusion, Dry mouth, Fever or chills, Dry skin, Increased hunger, Increased thirst.

Dosage and administration:

Adult: 1 to 2 capsules, 2 to 3 times in 24 hours.

- always respecting the schedules, the doses and the duration of the treatment.
- Discontinuation of treatment: the treatment should not be discontinued without the knowledge of the doctor.
- In case of missing a dose, it should be used as soon as noticing. If it is close to the time of the next dose, skip the missed dose and resume the dosing schedule. extra dose should not be used to make up for a missed dose.

Overdose:

- Linked to oxomemazine hydrochloride: the clinical picture may be characterized by depression and coma. Treatment is symptomatic and may be necessary. artificial respiration and anticonvulsants.
- Linked to paracetamol: a solid dosage causes hepatic cytolysis, with susceptibility to complete and irreversible necrosis. The clinical signs manifest usually within the first 24 hours. Treatment should be performed in specialized unit.

Storage conditions:

Store at temperature not exceeding 30°C, protect from light and moisture, out of reach of children.

How supplied:

A carton box contains 3 pvc/alu blister strips, each containing 10 caps.

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product but unlike any other products.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)

UGARIT PHARMACEUTICAL Co.
(Fanari & Partners), Aleppo - Syria



📞📧🌐/Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

