



سبيرم أوف

بويضات مهبلية

التركيب:

كل بويضة تحتوي على: نونوكسينول-٩ ١٠٠ ملغ.

المواصفات:

بولي إيثيلين غليكول، بيكرينات الصوديوم، سترات الصوديوم، حمض الطرطريك.

الاستخدام: يتم استخدامه لمنع الحمل.

مضادات الاستخدام:

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه السوليفيت، هذا المستحضر يحوي على مركب صوديوم ميتايبسولفيت الذي قد يسبب تفاعلات حساسية خطيرة لبعض الأشخاص.

خلال الست أسابيع الأولى من الولادة.

إذا عانيت سابقاً من متلازمة الصدمة السمية.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه النونوكسينول ٩ أو أي جزء آخر من المستحضر.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه قافير أو أطعمة أو مواد أخرى. أخبر طبيبك عن الحساسية والعلامات التي لديك.

إذا كنت أنت أو شريكك مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

إذا كنت حاملاً أو قد تكون حاملاً. لا تستخدم (nonoxynol 9) إذا كنت حاملاً.

أخبر طبيبك والصيدلي عن جميع الأدوية (الوصفات الطبية أو بدون وصفة طبية، المنتجات الطبيعية، الفيتامينات) والمشاكل الصحية. يجب عليك التحقق للتأكد من أنه آمن لك أن تأخذ (nonoxynol 9) مع جميع

الأدوية والمشاكل الصحية الخاصة بك. لا تبدأ أو توقف أو تغير جرعة أي دواء دون استشارة طبيبك.

التأثيرات الجانبية:

على الرغم من أنه قد يكون نادراً، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً معتدلة عند تناول الدواء. أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية التي قد تكون مرتبطة بأثر جانبي سيء للغاية:

* علامات رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي. شعيرة؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع أو بدون حمى؛

ضيق في الصدر أو الحلق. صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث؛ بحّة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

- تهييج المهبل.

- حرق.

- صعوبة التبول.

- ألم عند التبول.

- إفرازات مهبلية كريهة الرائحة.

التحذيرات والاحتياطات:

أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية بأنك تستخدم (nonoxynol 9). وهذا يشمل الأطباء والممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان.

لا يوقف هذا الدواء انتشار أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد الذي ينتقل عن طريق الدم أو ممارسة الجنس.

لا تمارس أي نوع من أنواع الجنس دون استخدام الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس أو البولي يوريثين. لا تشارك الإبر أو الأشياء الأخرى مثل فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة.

قد يسبب هذا الدواء ضرراً إذا ابتلع. إذا ابتلع استخدم الماء لإزالة المستحضر، فاقص بالطبيب أو مركز مراقبة السموم على الفور.

استل الطبيب قبل الاستخدام في حال كان لديك:

اجهاض حديث حيث يجب ألا يتم حمل حالياً أو حالة مرضية في المهبل أو الرحم.

توقف عن استخدام المستحضر وإسأل الطبيب في حال:

- إذا كان لديك أو لدى شريكك الجنسي إحساس بحرق، حكة أو تخريش آخر في المهبل أو القضيب أو صعوبة أو ألم عند التبول أو في حال معاناتك من ألم بطني، حرارة، قشعريرة أو إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو في حال الحمل.

الحمل: إذا كنت حاملاً أو حملت أثناء استخدام (nonoxynol 9)، فاقص بطبيبك على الفور.

الارتجاع: أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. سوف تحتاج إلى التحدث عن أي مخاطر على طفلك.

طريقة الاستخدام:

يستخدم (بيوض 9 nonoxynol) حسب طلب الطبيب. اقرأ جميع المعلومات المعطاة لك. اتبع جميع التعليمات بدقة.

لا تأخذ (بيوض 9 nonoxynol) عن طريق الفم. للاستخدام المهبل فقط. احفظه بعيداً عن فمك وأنفك وعينيك (قد يهترق).

لا تستخدم (بيوض 9 nonoxynol) عن طريق المستقيم.

اغسل اليدين قبل وبعد الاستخدام.

ضعي البويضة في غضون ١٠ دقائق على الأقل قبل الجماع. إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، يعمل (بيوض 9 nonoxynol) لمدة تصل إلى ساعة واحدة.

لاستخدم البويضة، انزع الغلاف المعدني.

إذا كنت تريد الاستحمام، انتظر ٦ ساعات بعد آخر جماع.

ماذا أفعل إذا فاتتني جرعة؟

يستخدم هذا الدواء حسب الحاجة. لا تستخدم أكثر مما قاله الطبيب.

في حالة الاشتباه في الجرعة الزائدة:

إذا كنت تعتقد أن هناك جرعة زائدة، فاقص بمركز مكافحة السموم أو احصل على رعاية طبية على الفور. كن مستعداً لإخبار أو إظهار ما تم أخذه وكميته ومتى حدث.

التعنية:

عبوة من الورق المقوى تحوي صفححة من (Pvdc) أبيض خليبي بحيث تحتوي على ٦ بويضات مهبلية.

شروط الحفظ:

يحفظ المستحضر دون الدرجة ٢٥ مئوية، بعيداً عن الرطوبة والحرارة العالية، بعيداً عن متناول الأطفال.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كبيره من المستحضرات.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك . فالتعليمات الصيدلاني هما الفيوران بالود وبقعه ومضروب .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الأدوية أبدا في متناول أيدي الأطفال

(تحذير الصيدلة العرب)

(محضر وزارة الصحة العرب)

شركة أوجاريت للصناعات الدوائية
فنري وشركاه - حلب سوريا

Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com



Sperm off

Vaginal Ovules

Composition:

Each ovule contains: nonoxinol-9 100 mg.

Excipients:

Polyethylene glycols, sodium bicarbonate, Sodium citrate, Tartaric acid.

Usage:

It is used to prevent pregnancy.

Contraindications:

- If you are allergic to sulfites. This product contains sodium metabisulfite which may cause severe allergic reactions in some people.
- within the first six weeks after giving birth.
- If you have ever had Toxic Shock Syndrome.
- If you are allergic to nonoxinol-9 or any other part of the preparation
- If you are allergic to drugs, foods or other substances. Tell your doctor about your allergies and signs.
- If you or your partner has HIV.
- If you are pregnant or may be pregnant. Do not use (nonoxynol 9) if you are pregnant.

Tell your doctor and pharmacist about all your medications (prescription or over-the-counter, natural products, vitamins) and health problems. You must check to make sure that it is safe for you to take (nonoxynol 9) with all of your drugs and health problems. Do not start, stop, or change the dose of any medicine without your doctor's advice.

Side Effects:

Although it may be rare, some people may experience very bad and sometimes fatal side effects when taking the drug. Tell your doctor or get medical help right away if you have any of the following signs or symptoms that may be related to a very bad side effect:
Signs of an allergic reaction, such as a rash, goosebumps; red, swollen, blistered, or peeling skin with or without fever, Tightness in the chest or throat. trouble breathing, swallowing, or speaking; Unusual hoarseness or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.

- Vaginal irritation.
- Burning.
- Difficulty urinating.
- Pain when urinating.
- Foul-smelling vaginal discharge.

Warnings and precautions:

Tell all of your health care providers that you take (nonoxynol 9). This includes doctors, nurses, pharmacists and dentists.

This medicine does not stop the spread of diseases such as HIV or hepatitis that are transmitted through blood or sex. Do not have any type of sex without using a latex or polyurethane condom. Do not share needles or other objects such as toothbrushes or razors. This medicine may cause harm if swallowed. If (nonoxynol 9) is swallowed, contact a physician or poison control center immediately.
Ask a doctor before use if you have:



recently had a miscarriage or an abortion been told that you should not become pregnant a vaginal or uterine condition.

Stop use and ask a doctor if:

you or your partner get burning, itching, a rash, or other irritation of the vagina or penis you or your partner have difficult or painful urination you get abdominal pain, fever, chills, or foul-smelling vaginal discharge you become pregnant.

Pregnancy:

If you become pregnant or become pregnant while using (nonoxynol 9), contact your doctor immediately.

Breastfeeding:

Tell your doctor if you are breast-feeding. You will need to talk about any risks to your child.

How to use:

Use (nonoxynol 9) Vaginal Ovules as directed by your physician. Read all the information given to you. Follow all instructions carefully.

Do not take (nonoxynol 9) Vaginal Ovules by mouth. For vaginal use only. Keep it away from your mouth, nose and eyes (it may burn).

Do not use (nonoxynol 9) Vaginal Ovules rectally.

Wash hands before and after use.

Put the Vaginal Ovule on at least 10 minutes before sex. If used the right way, it (nonoxynol 9) Vaginal Ovules works for up to one hour.

To use the Vaginal Ovule, peel off the metal sleeve.

If you want to shower, wait at least 6 hours after your last sexual intercourse..

What do I do if I miss a dose?

This medication is used as needed. Do not use more than your doctor said.

If an overdose is suspected:

If you think there has been an overdose, call a poison control center or get medical attention right away. Be prepared to tell or show what was taken, how much, and when it happened.

Packing:

A carton box contains one Pvc milky blister strips, each strip contains 6 Vaginal Ovules.

Storage conditions:

Store below 25 °C, keep away from moisture and excessive heat, out of reach of children.

THIS IS A MEDICATION

-A medication is a product but unlike any other products.
-A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
-Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
-Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
-Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)



Ugarit pharmaceutical Co.
Fanari & Partners - Aleppo, Syria
f @ © /Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

